

## Gebrauchsinformation: Information für Anwender



# Sensicutan® -Salbe

### Wirkstoffe:

Bisabolol, Heparin-Natrium 20 000 I.E.

### Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in der Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach ein bis zwei Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Sensicutan-Salbe und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Sensicutan-Salbe beachten?
3. Wie ist Sensicutan-Salbe anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Sensicutan-Salbe aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### 1. Was ist Sensicutan-Salbe und wofür wird sie angewendet?

Sensicutan ist eine cortisonfreie Salbe. Sensicutan-Salbe enthält die beiden Wirkstoffe Bisabolol und Heparin-Natrium. Diese aufeinander abgestimmte und ausgewogene Kombination führt mit raschem Wirkungseintritt zu einer Entzündungshemmung und lindert den häufig unangenehmen Juckreiz. Das hautfreundliche Emulsionssystem der Salbengrundlage erlaubt die Anwendung von Sensicutan-Salbe bei trockener, normaler und feuchter Haut.

Sensicutan-Salbe wird als Zusatzbehandlung bei entzündlichen, nicht-infektiösen, stark juckenden Hauterkrankungen angewendet. Wenn Sie sich nach ein bis zwei Wochen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### 2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Sensicutan-Salbe beachten?

#### Sensicutan-Salbe darf nicht angewendet werden:

- wenn Sie allergisch gegen Bisabolol, oder Heparin-Natrium oder einen der in Abschnitt 6, genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- Bei Blutungsneigung und bei einer verringerten Zahl von Thrombozyten sollte die Anwendung von Heparin-Präparaten unterbleiben.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Sensicutan-Salbe anwenden.

Sensicutan-Salbe sollte nicht mit offenen Wunden, den Augen und den Schleimhäuten in Berührung kommen.

Falls Sie Heparin noch in einer anderen Form anwenden, besprechen Sie dies bitte mit Ihrem Arzt. Bei Auftreten einer allergischen Reaktion ist die Anwendung sofort abzubrechen.

Bei Schwangeren und Kindern ist eine großflächige Langzeitanwendung zu vermeiden.

#### Anwendung von Sensicutan-Salbe zusammen mit anderen Arzneimitteln:

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/angewenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Bisher sind keine Wechselwirkungen von Sensicutan-Salbe mit anderen Arzneimitteln bekannt.

#### Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillperiode kann bei bestimmungsgemäßem, kurzfristigem Gebrauch und nach gegenwärtigem Erkenntnisstand erfolgen.

#### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Keine Auswirkungen.

#### Sensicutan-Salbe enthält Sorbinsäure.

Sorbinsäure kann örtlich begrenzte Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

### 3. Wie ist Sensicutan-Salbe anzuwenden?

Zum ersten Öffnen den Dorn durch die Tubenschutzmembran drücken.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

Die Salbe soll 2–3 mal täglich auf die erkrankten Hautpartien aufgetragen werden. Eine Anwendung sollte nicht länger als 1–2 Wochen erfolgen.

#### **Anwendung bei Kindern und Jugendlichen**

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, wird die Anwendung bei Kindern unter 3 Jahren nicht empfohlen.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Sencicutan-Salbe angewendet haben, als Sie sollten**

sind keine Auswirkungen zu erwarten.

#### **Wenn Sie die Anwendung von Sencicutan-Salbe vergessen haben**

Wenden Sie nicht die doppelte Menge an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei dem auftreten müssen.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem (Details siehe unten) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Österreich

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Trisengasse 5, AT-1200 WIEN

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

In sehr seltenen Fällen können bei Patienten mit extrem empfindlicher Haut Hautunverträglichkeiten auftreten. Im Allgemeinen klingen diese Hauterscheinungen nach dem Absetzen rasch wieder ab.

Bei einer spezifischen allergischen Reaktion ist ein Arzt aufzusuchen und die Anwendung abzubrechen.

#### **5. Wie ist Sencicutan-Salbe aufzubewahren?**

Nicht über 25°C lagern

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen: 6 Monate

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

#### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

##### **Was Sencicutan-Salbe enthält**

Die Wirkstoffe sind: 100 g enthalten: Bisabolol 0,30 g, Heparin-Natrium 20 000 I.E.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Fettalkohole ethoxyliert, Mandelöl, Mittelkettige Triglyceride, Myristylalkohol, Zitronensäure, Kollagenhydrolysat,  $\alpha$ -Tocopherolacetat, Dexpanthenol, Sorbinsäure 0,1 g, Salicylsäure 0,3 g, gereinigtes Wasser.

##### **Wie Sencicutan-Salbe aussieht und Inhalt der Packung**

Weißer Salbe.

Aluminiumtube zu 30 und 80 g

#### **Pharmazeutischer Unternehmer**

Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH  
Am Harras 15, D-81373 München, Deutschland  
Tel.-Nr.: +49 89 747 367-0  
Fax-Nr.: +49 89 747 367-19  
e-mail: [mail@harraspharma.de](mailto:mail@harraspharma.de)

#### **Hersteller**

Gehrlicher Pharmazeutische Extrakte GmbH  
D-82547 Eurasburg, Deutschland  
Vertrieb in Österreich  
HWS OTC Service GmbH  
Steindorf 65, 5570 Mauterndorf, Österreich  
Tel. 06472/20076, Fax 06472/20076-41

**Zulassungsnummer:** 1-24304

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2013.**